

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP -5-9-72 416592

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative - 67-084 - STRASBOURG CEDEX

Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67-070 - STRASBOURG - CEDEX

Supplément n° 1 au bulletin n°144 du mois de septembre 1972.

4 septembre 1972.

GRANDES CULTURES

HOUBLON

MILDIOU

L'état sanitaire des houblons est satisfaisant en cette période de début de cueillette. Il faut cependant songer à poursuivre la protection contre le Mildiou dans les houblonnières devant être récoltées tardivement. Les houblonnières qui ne seront récoltées qu'après le 12 septembre, devront faire l'objet d'un dernier traitement fongicide à la fin de la présente semaine.

POMMES DE TERRE

MILDIOU

Dans les cultures d'altitude, procéder au défanage dès l'arrivée à maturité des tubercules.

TABAC

MILDIOU

Un premier foyer de Mildiou du tabac a été décelé à SPECHBAC-LE-BAS (68), par le Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes (S.E.I.T.A.). Nous rappelons que les producteurs de tabac doivent appliquer les instructions contenues dans l'arrêté préfectoral rendant obligatoire la lutte contre le Mildiou du tabac, et suivre les recommandations du S.E.I.T.A.

ARBRES FRUITIERS

POMMIER - POIRIER

MALADIES DE CONSERVATION

L'époque la plus favorable à la contamination des fruits par les divers champignons responsables des maladies de conservation se situe fin août, début septembre.

Afin de limiter les dégâts sur les pommes et les poires destinées à être conservées, il est conseillé d'effectuer un traitement dès que possible.

Les fongicides les plus efficaces sont: le Bénomyl à 30 g de M.A./hl, le Captane à 150 g de M.A./hl et le Thiabendazole à 100 g de M.A./hl.

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Les dernières captures de papillons du deuxième vol ont été enregistrées le 17 août dans nos postes de contrôle. Les températures nocturnes et matinales basses pour la saison, risquent d'augmenter la longévité des papillons.

D'autre part, les températures crépusculaires restent fréquemment favorables à l'activité sexuelle des papillons.

De nouvelles pontes peuvent encore être déposées mais il nous est difficile d'en définir l'importance.

En conséquence, un dernier traitement insecticide devra être réalisé dans la période du 5 au 7 septembre.

Tenir compte de la législation actuellement en vigueur concernant les délais d'emploi des produits.

On pourra intervenir en traitement mixte (Carpocapse - Maladies de conservation). Avoir soin de s'assurer de la compatibilité des produits, indications figurant toujours sur les emballages ou les tracts accompagnant les spécialités commerciales.

V I G N E

OIDIUM

Des foyers d'Oïdium se développent rapidement depuis ces derniers jours dans certaines parties du vignoble. Nous invitons les viticulteurs à visiter soigneusement leurs parcelles, de façon à pouvoir intervenir rapidement en cas de nécessité.

Les Ingénieurs chargés des
Avertissements Agricoles :
C. GACHON et Ch. JANUS

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la
Circonscription Phytosanitaire
"ALSACE et LORRAINE"
J. HARRANGER